

BAYCIDAL 25 WP

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:
MZ-0552/04 z dnia 27.01.2004 r.



PRODUCENT
BAYER CropScience AG
Landwirtschaftszentrum Monheim
Alfred Nobel Strasse 50
D-51368 Leverkusen, Niemcy
Tel./fax (+49 21) 733 80

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY /DYSTRYBUTOR/
BAYER Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel.: 022 572 36 61
faks: 022 572 36 09

Zawiera 25 % wag. triflumuronu – insektycydu, związku z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju owadów, oraz 3.5 % wag. alkiloarylosulfonianu sodu.

Preparat owadobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.
Charakteryzuje się niską toksycznością dla ludzi i zwierząt stałocieplnych.



N

niebezpieczny dla środowiska

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

- S 1/2** Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
- S 13** Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- S 22** Nie wdychać pyłu.
- S 35** Usuwać produkt i jego opakowania w sposób bezpieczny.
- S 46** W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- S 57** Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

- R 51/53** Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

ZASTOSOWANIE

Baycidal 25WP przeznaczony jest do zwalczania much w oborach, chlewniach, kurnikach, na śmietnikach, w dołach kloacznych, na wysypiskach śmieci.

Może być również stosowany do zwalczania chrząszcza ściółkowego (pleśniakowca lśniącego – *Alphitobius diaperinus*) w pomieszczeniach inwentarskich.

Baycidal 25WP hamuje rozwój larw much.
Niszczy larwy w kale, nawozie, gnojownicy.
Nie zabija dorosłych owadów.

Skuteczność Baycidalu 25WP jest tym większa, im wcześniej na wiosnę zastosujemy preparat pierwszy raz, aby uniknąć masowego pojawienia się much. Larwy much rozwijają się w odchodach, ściółce lub gnojownicy; przed przepooczwarczeniem przemieszczają się do warstw powierzchniowych podłoża, dlatego Baycidalem 25WP wystarczy potraktować powierzchnię ściółki lub gnojowicy i nie trzeba go mieszać z całą warstwą podłoża. Dla uzyskania większej skuteczności zaleca się muchy dorosłe zwalczać klasycznym preparatem owadobójczym.

SPOSÓB UŻYCIA

Baycidal 25WP jest proszkiem, który przed użyciem miesza się z wodą tworząc zawiesinę. Proszek należy odmierzyć za pomocą załączonej miarki i zmieszać z wodą w pojemniku (np. w wiadrze).

Aby zapobiec rozwijaniu się much w pomieszczeniach gospodarskich (stajniach, oborach, kurnikach, itp.), ważne jest przeprowadzenie pierwszego opryskiwania gdy tylko zauważone będą pierwsze muchy.

Traktowanie ściółki Baycidalem 25WP należy wykonywać w ciągu całego sezonu wylęgu much, aż do momentu, gdy muchy nie nadlatują już do pomieszczeń z zewnątrz. Do opryskiwania (np. opryskiwaczem plecakowym) należy zmieszać odpowiednią ilość (10 lub 20g) preparatu z ilością wody wystarczającą do potraktowania 10m² powierzchni nawozu (np. z 1 litrem). W przypadku używania konewki – można użyć 10 lub 20g preparatu na 3 – 5 l wody, aby umożliwić równomierne rozprowadzenie preparatu.

Załączona do opakowania miarka mieści 10g Baycidalu 25WP.

1kg preparatu wystarcza na 500 – 1000m² powierzchni nawozu.

W miejscach gdzie ze względu na szybki rozwój populacji owadów może pojawić się odporność powinno stosować się rotację preparatów tzn. używać środków zawierających substancje czynne należące do różnych grup chemicznych.

Pierwszy raz należy zastosować 20g Baycidalu 25WP na 10m² powierzchni; kolejne razy – 10g preparatu na 10m².

Odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi dezynsekcjami powinny wynosić na początku 2 tygodnie (od pierwszego do trzeciego opryskiwania), potem zaś – 3 tygodnie.

Stosowanie w odstępach 3 tygodniowych należy kontynuować aż do zakończenia sezonu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Przed przeprowadzeniem oprysku usunąć z pomieszczenia zwierzęta domowe, ptaki w klatkach, akwaria z rybkami i rośliny ozdobne, żywność i naczynia na żywność.

Nie opryskiwać powierzchni, na których przyrządza się żywność.

- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
- Unikać przebywania w zasięgu rozpylanej cieczy.
- Nie opryskiwać preparatem łóżeczek ani pościeli małych dzieci oraz powierzchni, z którymi będzie stykała się nie zapakowana żywność.
- Nie opryskiwać urządzeń elektrycznych.
- W przypadku obłania ciała preparatem, skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
- Po pracy umyć dokładnie całe ciało wodą z mydłem.
- Cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia urządzeń wykorzystywanych do opryskiwania nie wylewać do rzek, dróg wodnych ani w pobliżu studni (preparat jest szkodliwy dla ryb).
- Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.

OBJAWY ZATRUCIA

- bóle i zawroty głowy;
- mdłości i wymioty;
- zaburzenia jelitowo-żołądkowe;
- osłabienie;
- podwyższone lub obniżone ciśnienie;
- podrażnienia i zaczerwienienia skóry i oczu.

PIERWSZA POMOC

W przypadku wdychania (szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach):
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło i wezwać lekarza.

W przypadku skażenia oczu:

W razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe.

Płukać oczy przy odwiniętych powiekach przez 15 minut.

Jeżeli wystąpią podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.

W przypadku skażenia skóry:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Skórę zmywać dużą ilością wody z mydłem, a następnie posmarować kremem z witaminą E.

W przypadku połknięcia:

Podać do wypicia co najmniej 0.5 l wody i jeżeli poszkodowany jest przytomny spowodować wymioty.

Nie powodować wymiotów w przypadku utraty przytomności ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia i przedostania się preparatu do płuc.

Wezwać lekarza.

ANTIDOTUM

BRAK - STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE W POLSCE

Gdańsk	058 349 28 31
Kraków	012 411 99 99
Warszawa	022 619 66 54
Poznań	061 847 69 46

MAGAZYNOWANIE

Preparat przechowywać w:

- oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach;
- w suchym i dobrze wentylowanym magazynie;
- w temperaturze od 0 do 30°C;
- w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci;
- z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia.

**POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
PREPARATU I OPAKOWANIEM**

Resztki niewykorzystanej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i zużyć na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Zużyte opakowania przekazać do uprawnionego odbiorcy.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA - ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

**ZALECENIA DOTYCZĄCE
WENTYLACJI**

Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Przed użytkowaniem pomieszczenia, w którym wykonano zabieg należy odczekać do czasu wyschnięcia opryskiwanych powierzchni.

DATA PRODUKCJI
OKRES WAŻNOŚCI 3 lata od daty produkcji
NUMER SERII
POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA