

GETOX ULTRA

Numer pozwolenia:

Producent: Themar Import-Eksport Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 75
02-820 Warszawa
tel./fax 022 894 60 00

Podmiot Odpowiedzialny Themar Import-Eksport Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 75
02-820 Warszawa
tel./fax 022 894 60 00



Gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do zwalczania szkodliwych owadów w pomieszczeniach.

Zawiera 0,015% wag. deltametryny (0.15 g/l) – związku z grupy syntetycznych pyretroidów. Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe



N

niebezpieczny dla środowiska

- R 50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- S 57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska;
- S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Zastosowanie:

GETOX Ultra przeznaczony jest do zwalczania w pomieszczeniach karaluchów, prusaków, mrówek, pcheł, pluskw, rybników cukrowych i innych owadów biegających.

Sposób stosowania:

Przed użyciem GETOX Ultra należy kilkakrotnie wstrząsnąć pojemnikiem. Otworzyć rozpylacz przez ustawienie dyszy na symbol rozpylania i nacisnąć dźwignię. Opryskiwać miejsca gnieźdzenia się owadów, ich kryjówki i drogi przebiegu. Podczas opryskiwania zwrócić uwagę na wszelkie szpary, zwłaszcza przy rurach c.o., rurach kanalizacyjnych, listwach przypodłogowych. W przypadku zwalczania mrówek faraona opryskać szerokim łukiem ścieżki prowadzące do gniazd. Na opryskanych powierzchniach preparat powinien tworzyć barierę na drodze do gniazda. W przypadku, gdy ścieżki nie są widoczne, opryskiwać miejsca najczęstszego gromadzenia się mrówek. W przypadku innych owadów opryskiwać miejsca, na których owady siadają.

Środki ostrożności:

- Przed wykonaniem oprysku usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta.
- Usunąć z pomieszczenia lub zabezpieczyć (przykryć grubym papierem lub schować w szafkach) żywność, naczynia na żywność, akwaria z rybkami.
- Nie opryskiwać urządzeń i powierzchni, z którymi będzie się stykała nieopakowana żywność.

- Preparat przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci.
- Nie opryskiwać preparatem zabawek i łóżeczek dziecięcych.
- Podczas wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
- Podczas pracy z produktem unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Po wykonaniu oprysku umyć starannie ręce wodą z mydłem.

Objawy zatrucia:

Preparat zawiera środek biobójczy z grupy pyretroidów. Przy ostrym zatruciu mogą wystąpić podniecenie, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, drżenie, zawroty głowy, bóle głowy, apatia, nudności i wymioty, ból w nadbrzuszu, drganie mięśni kończyn, utrata przytomności, drgawki i śpiączka (przy bardzo dużych dawkach).

Pierwsza pomoc.

W przypadku wdychania:

Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania, podawać tlen do oddychania. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

W przypadku skażenia oczu:

Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 minut. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem-okulistą.

W przypadku skażenia skóry:

Obficie zmywać letnią, bieżącą wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia:

Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody (jeśli poszkodowany jest przytomny). Zapewnić pomoc lekarską.

Magazynowanie:

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym w temperaturze 0-30 °C, z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią. Chronić przed dziećmi. Zabezpieczyć pojemniki przed mechanicznym uszkodzeniem.

Postępowanie z odpadami preparatu i opakowaniem:

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie odprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Odpady preparatu, produkty przeterminowane oraz opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony lub przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Zalecenia dotyczące wentylacji:

Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Przed użytkowaniem pomieszczenia, w którym wykonano oprysk należy odczekać do czasu wyschnięcia opryskanych powierzchni.

Skutek działania środka biobójczego:

Preparat wykazuje działanie kontaktowe (efekt biobójczy następuje po zetknięciu owada z opryskaną powierzchnią).

W przypadku ponownego pojawienia się insektów, oprysk należy powtórzyć po około dwóch tygodniach.

ANTIDOTUM: Brak – stosować leczenie objawowe.

W sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Ośrodki toksykologiczne:

Gdańsk (058) 349 28 31, Kraków (012) 411 99 99, Warszawa (022) 619 66 54, Poznań (061) 847 69 46

Data ważności:

Nr serii:

Zawartość netto: